

沖縄県PDの現況報告 ～2014年12月末時点～

アンケート協力施設 17施設


- ・沖縄県立北部病院
- ・琉球大学医学部附属病院
- ・同仁病院
- ・さくだ内科クリニック
- ・座間味診療所
- ・首里城下町クリニック
- ・とよみ生協病院
- ・沖縄県立宮古病院
- ・沖縄県立南部医療センター
- ・沖縄県立中部病院
- ・徳山クリニック
- ・みやざと内科クリニック
- ・大浜第一病院
- ・まつおTCクリニック
- ・吉クリニック
- ・豊見城中央病院
- ・沖縄県立八重山病院
- ・こども医療センター

(順不同)


2014年12月末の現況

患者総数	:	99人(男59人, 女40人)
新規導入数	:	26人
中止数(死亡)	:	12人(3人)
平均年齢	:	59.8才
平均PD継続期間	:	2年3ヶ月
最長PD継続期間	:	12年
CAPD管理施設数	:	17施設


患者総数の推移




原疾患 n = 92



平均年齢の推移 $n=92$



導入理由(複数回答可) n=92



血液透析歴の有無と期間

血液透析歴

あり	20.1% (19人)
なし	71.7% (66人)
未記載	7.6% (7人)


n = 92

平均血液透析期間 6ヶ月 (1ヶ月～1年7ヶ月)

0ヶ月～1ヶ月	(21.1%) 4人
1ヶ月～ 6ヶ月	(26.3%) 5人
6ヶ月～1年	(10.5%) 2人
1年～ 2年	(10.5%) 2人
記載なし	(31.6%) 6人

PD継続期間

n = 92




平均
・沖縄: 2年3ヶ月 (1ヶ月～11年2ヶ月)

・沖縄: 5年未満 91.3% 5年以降 8.7%


■ 1年未満 ■ 2年未満 ■ 3年未満 ■ 4年未満 ■ 5年未満
■ 6年未満 ■ 7年未満 ■ 8年未満 ■ 9年未満 ■ 10年以上

現在のPD治療方法 n = 92




■ CAPD ■ CCPD ■ NPD ■ その他 ■ 未記載

導入時のPD治療方法 n=92



■ CAPD ■ CCPD ■ NPD ■ その他 ■ 未記載

接続システム n = 92



低Ca透析液使用の有無 n = 92

はい 79.3% (72人)

いいえ 20.7% (19人)

未記載 1% (1人)

イコデキストリン製剤の使用有無

n =92

はい 31.5 % (29人)

いいえ 69.5% (63人)

PD導入時SMAP法の実施有無 n = 92

はい 22.8% (21人)

いいえ 70.7% (65人)

未記載 6.5% (6人)


PD+HD併用療法の有無 $n = 92$

はい 18.5% (17人)

いいえ 81.5% (75人)

HD併用の頻度

n = 17



■ 週1回 ■ 2週に1回 ■ 月に1回 ■ その他

腹膜休息の有無 $n = 17$

はい 91.9% (15人)

未記載 8.1% (2人)

腹膜機能検査の実施有無 n = 92


はい 45.7% (42人)

いいえ 39.1% (36人)

未記載 15.2% (14人)

腹膜機能検査結果のカテゴリー

n = 42



副甲状腺摘出術の有無(1年以内)

n = 92

はい 1.1% (1人)

いいえ 89.1% (82人)

未記載 9.8% (9人)

カテーテル関連手術の有無(1年以内)

n = 92

あり 4.3% (4人)

いいえ 93.5% (86人)

未記載 2.2% (2人)

アンルーピング

0人

部分置換+出口部変更

2人


カテーテル入れ替え術

0人


その他 1人

未記載 1人

出口部ケア（消毒）の方法（複数回答可）



出口部観察の頻度



検査データ

(mg / dl)


- BUN 54.5 ± 30
- Cr 9.6 ± 6.5
- Ca 8.6 ± 1.7
- P 5.5 ± 2.9
- TP 6.1 ± 1.2
- Alb 3.5 ± 1.7
- Hb 10.9 ± 2.1
- Hct 36.8 ± 6.3
- $\beta 2$ -MG 25.3 ± 20.3
- I-PTH $216.7 \pm 441.1^*$
- CTR 47.8 ± 10.7 (%)

ESA製剤の使用有無 n = 92


あり	88.0%	81人
なし	7.6%	7人
未記載	4.3%	4人

エポジン／エスポー 0人
ネスプ／ミルセラ 73人
未記載 8人

血压(mmHg) **n = 92**




降圧剤の使用有無 n = 92



血圧(mmHg)別 降圧薬投与量

n = 82

人数



PD導入後の合併症の有無 $n = 92$

脳血管障害

あり	0% (0人)
なし	97.8% (90人)
未記載	2.2% (2人)

虚血性心疾患

あり	2.2% (2人)
なし	95.7% (88人)
未記載	2.2% (2人)

重症感染症

あり	1.1% (1人)
なし	96.7% (89人)
未記載	2.2% (2人)

悪性新生物

あり	0% (0人)
なし	97.8% (90人)
未記載	2.2% (2人)

PD中止理由 n =12

- 長期のPD歴 3人
- 体液過剰 3人
- 死亡 3人
 - *乳癌転移 1人
 - *心不全 1人
 - *肺血症 1人
- 透析効率不足(残腎機能低下含む) 2人
- 腹膜炎 1人
- 管理困難 1人

腹膜炎の有無 n =92

はい 9.8% (9人)

いいえ 88.0% (81人)

未記載 2.2% (2人)

* 腹膜炎での中止除く

腹膜炎の起因菌 n =9

■起因菌

- S.epidermidis 1人
- S. hominis 2人
- S. capitis 1人
- Stretococcus salivarius?? 1人
- Serratia 1人
- 不明 (culture negative 1人含む) 2人
- Nonfermenting GNR(同定不可) 1人

■治療後、PD継続